

Preguntas para tu Proveedor de Atención Médica

Si quieres tener una consulta exitosa con tu proveedor de atención médica, deberás recordar hacerle todas las preguntas que tengas. A continuación, encontrarás algunas preguntas que puedes usar para obtener más información sobre VUMERITY® (diroximel fumarate) y sobre cómo te podría ayudar con tu esclerosis múltiple (EM) recurrente.

Preguntas acerca de un tratamiento oral

- ¿Podemos hablar sobre un tratamiento oral como VUMERITY?
- ¿Cuáles son los posibles beneficios y riesgos de VUMERITY?

Efectividad de VUMERITY

- ¿Puede VUMERITY ayudar a reducir mis recaídas? ¿Me puede informar acerca de los resultados del estudio clínico para VUMERITY?
- ¿Puede explicarme cómo VUMERITY podría ayudar a retrasar la progresión de la discapacidad física?
- Según mi última imagen por resonancia magnética, ¿es posible que VUMERITY sea una opción para mí?
- ¿Cómo podría VUMERITY ayudarme con mi EM recurrente?

Seguridad de VUMERITY

- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios graves de VUMERITY?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de VUMERITY y cuánto duran generalmente?
- ¿Qué debo hacer si tengo efectos secundarios?
- ¿Tendré que hacerme pruebas de laboratorio antes de comenzar o durante el tratamiento para monitorear cómo me está yendo con VUMERITY?

Próximos pasos

- Estoy interesado en comenzar un tratamiento con VUMERITY para mi EM recurrente. ¿Qué pasos debo seguir?
- ¿Con qué tipo de apoyo puedo contar durante mi tratamiento con VUMERITY?
- ¿Cuándo debo programar mis citas de seguimiento?

¿Qué es VUMERITY® (diroximel fumarate)?

- VUMERITY es un medicamento de venta bajo receta que se usa para tratar a personas con formas recurrentes de esclerosis múltiple (EM), incluidos el síndrome clínicamente aislado, la enfermedad recurrente remitente y la enfermedad secundaria activa progresiva, en adultos
- Se desconoce si VUMERITY es seguro y eficaz en niños

Información Importante de Seguridad

No tomes VUMERITY:

- Si has tenido una reacción alérgica (como ronchas, urticaria, hinchazón de la cara, labios, boca o lengua, o dificultad para respirar) al diroximel fumarate, dimethyl fumarate, o a cualquiera de los ingredientes de VUMERITY.
- Si estás tomando dimethyl fumarate.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad en la página siguiente, y la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Información para el Paciente](#).

En español: [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Información para el Paciente](#).



Recuerda llevar esta guía de discusión a tu próxima cita

Es una excelente forma de iniciar una conversación para ayudarte a decidir, junto a tu proveedor de atención médica, si VUMERITY es el tratamiento adecuado para ti



El siguiente paso es que hables sobre VUMERITY® (diroximel fumarate) con tu proveedor de atención médica. Lleva esta guía de discusión a tu próxima cita.

Información Importante de Seguridad (cont.)

Antes de tomar VUMERITY y mientras lo estés tomando, informa a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluso:

- Si tienes problemas de hígado
- Si tienes problemas renales
- Si tienes o has tenido recuentos bajos de glóbulos blancos o una infección
- Si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si VUMERITY dañará a tu bebé en gestación
 - Si quedas embarazada mientras tomas VUMERITY, habla con tu proveedor de atención médica sobre la posibilidad de inscribirte en el Registro de embarazo BlossomMS. Puedes inscribirte en este registro llamando al **1-833-569-2635** o visitando www.blossomspregnancyregistry.com. El propósito de este registro es monitorear tu salud y la de tu bebé.
- Si estás amamantando o planeas hacerlo. Se desconoce si VUMERITY pasa a la leche materna. Habla con tu proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a tu bebé mientras estés tomando VUMERITY

Informa a tu proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que estés tomando, incluidos medicamentos de venta bajo receta y de venta libre, vitaminas, y suplementos a base de hierbas.

¿Qué debo evitar mientras tomo VUMERITY?

- No tomes alcohol al momento de tomar una dosis de VUMERITY

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VUMERITY?

VUMERITY puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **reacción alérgica** (como ronchas, urticaria, hinchazón de la cara, labios, boca o lengua, o dificultad para respirar). Deja de tomar VUMERITY y busca ayuda médica de emergencia de inmediato si tienes alguno de estos síntomas
- **LMP (Leucoencefalopatía multifocal progresiva)**, una infección cerebral poco común que generalmente conduce a la muerte o a una discapacidad grave durante un período de semanas o meses. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas alguno de estos síntomas de LMP:
 - Debilidad en un lado del cuerpo que empeora
 - Torpeza en los brazos o piernas
 - Problemas en la visión
 - Cambios en el pensamiento y la memoria
 - Confusión
 - Cambios en la personalidad
- **infecciones por herpes zóster (culebrilla)**, incluidas las infecciones del sistema nervioso central
- **otras infecciones graves**

- **disminución en el recuento de glóbulos blancos.** Tu proveedor de atención médica deberá hacerte un análisis de sangre para verificar tu recuento de glóbulos blancos antes de comenzar el tratamiento con VUMERITY y mientras estés en tratamiento. Deberás hacerte análisis de sangre después de 6 meses de tratamiento, y luego cada 6 a 12 meses
- **problemas hepáticos.** Tu proveedor de atención médica deberá hacerte análisis de sangre para verificar tu función hepática antes de que comiences a tomar VUMERITY y durante el tratamiento si fuera necesario. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes alguno de estos síntomas de un problema hepático durante tu tratamiento:
 - Cansancio extremo
 - Pérdida de apetito
 - Dolor en el lado derecho del estómago
 - Orina oscura o de color marrón (color té)
 - Coloración amarillenta en la piel o en la parte blanca de los ojos
- **problemas gastrointestinales graves**, como sangrado, úlceras, obstrucción y desgarros (perforación) del estómago o los intestinos. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes alguno de estos síntomas durante el tratamiento:
 - dolor en el área del estómago que no desaparece
 - heces de color rojo brillante o negro (que parecen alquitrán)
 - vómitos graves
 - diarrea grave
 - tos con sangre o coágulos de sangre
 - vómito con sangre o vómito que parece "posos de café"

Los efectos secundarios más comunes de VUMERITY incluyen:

- flushing o enrojecimiento de la piel, rojez, picazón o sarpullido
- náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago o indigestión
- El flushing o enrojecimiento de la piel y los problemas estomacales son las reacciones más comunes, especialmente al comienzo del tratamiento, y podrían disminuir con el tiempo. Tomar VUMERITY con alimentos (evita comidas o meriendas con alto contenido de grasas y calorías) podría ayudar a reducir el flushing o enrojecimiento de la piel. Llama a tu proveedor de atención médica si tienes alguno de estos síntomas y te molestan o no desaparecen. Pregúntale a tu proveedor de atención médica si tomar aspirina antes de tomar VUMERITY podría reducir el flushing o enrojecimiento de la piel.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VUMERITY. Llama a tu proveedor de atención médica para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puedes informar sobre los efectos secundarios a la FDA llamando al **1-800-FDA-1088**. Para obtener más información, visita www.dailymed.nlm.nih.gov

Por favor, consulta la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).

En español: [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).

